

21 fev. 1790

Suite Des Recherches
Sur Les Grouelles

Par Jacques Premier chirurgien interne
gagnant maîtrise, de L'Hotel Dieu St Roy
De Montpellier



après avoir indiqué dans la première partie de
mon mémoire les moyens propres à attaquer
généralement le vice Scrophuleux dans sa source; il
est essentiel de marquer avec précision l'application
de ces moyens aux différentes maladies secondaires
dont le vice est la cause.

quoique toutes les maladies secondaires aient pour
cause matérielle une dégénération Scrophuleuse de
la lymphe; les effets de ce vice dans les différentes
parties du corps sont si différents qu'ils en imposent
souvent pour d'autres maladies qu'on croiroit d'abord
avoir une autre source.

La manière prothéiforme avec laquelle le vice
Scrophuleux manifeste ses effets dans les maladies
secondaires dépend de l'idiosyncrasie du sujet, de
son âge, de son sexe, de la nature et de l'usage
de l'organe affecté, de la diathèse régnante du

ARC 302.4 n° 89

Climat qu'il habite et Des Différens Vices ou
Maladies qui le compliquent.

Toutes les Circonstances qui produisent une variation
si sensible, rendent presque toujours le Diagnostic
peu certain, le pronostic plus d'angereux et la Cure
plus difficile, Lors qu'on ne porte pas la plus scru-
puleuse attention sur la Cause première de la maladie
et sur la marche des Symptomes qui en sont les effets,
Symptomes qui quoique chargés des nuances différentes
portent dans le fonds des Caractères propres à nous
les faire distinguer. (Voyez la 2^{eme} Sect de la 1^{ere}
Partie de ce mémoire.)

Dans le traitement des maladies secondaires il
faut porter la plus grande attention aux Circonstances
particulieres qui doivent en faire varier le traitement,
Car il seroit de la plus grande inlconsequence et du plus
grand d'anger d'appliquer ^{indifferement} aux maladies secondaires
le traitement que j'ai proposé pour les Scrophuleuses en
general.

Cure De L'ophtalmie Scrophuleuse (V)

De toutes les maladies secondaires, L'ophtalmie est une
des plus communes et des plus opiniâtres, et sur tout
lorsqu'elle n'est pas attaquée dans son principe; son
opiniâterete est d'autant plus invincible que les humeurs
qui lubrefient la partie antérieure du globe de l'œil ont
contracté une acrimonie Scrophuleuse, et que la partie

est atteinte d'un vice organique qui la dispose à cette maladie.

Les observations pratiques nous prouvent, que dans le principe de cette maladie, les émetiques sont des tous les moyens internes connus ceux dont on retire le plus de succès, et dont on néglige peut-être trop l'usage dans le traitement de cette maladie. La saignée que quelque praticien s'est précéder à l'administration de l'émetique ne doit être pratiquée que dans le cas où le sujet est fort plethorique, (ce qui n'est pas ordinaire) ou que la maladie serait compliquée avec la diathèse phlogistique. néanmoins si sans des circonstances particulières qui doivent décider l'usage de la saignée, l'inflammation étoit portée à un certain degré d'intensité, il faudroit faire quelque saignée locale, par l'application des sangsues, des ventouses scarifiées, par l'ouverture de la veine angulaire, ou de l'artere temporale, ou par l'ouverture des vaisseaux qui rampent sous la conjonctive. on doit être fort réservé sur cette dernière en la facilité qu'a cette espèce d'inflammation à se terminer par la suppuration. (dans l'application des sangsues j'ai observé que les moyens qu'on emploie communément pour arrêter le sang, qui quelque fois offre assés de difficulté, détruisent l'effet produit par leur application et augmentent l'engorgement

en gênant la circulation. Pour prévenir cet inconvénient, je substitue au noué d'ambaleur, ou autre bandage compressif, l'application d'un emplâtre agglutinatif. Pour cela je commence par épancher le sang en lavant la partie avec de l'eau fraîche, je mets sur les picqueures un peu de papier brûlé ou d'amadou que je soutiens avec les doigt, je detache ensuite la partie, et j'applique l'emplâtre agglutinatif ayant le soin de le faire chauffer. Ce moyen peut également servir pour arrêter le sang dans les parties où le bandage ne convient point.) après les saignées locales et l'usage des vomitifs qu'on réitère suivant les circonstances, on doit se tenir aux purgatifs doux, tels que laubarbe ou le kina combiné avec la magnésie blanche; on passe ensuite à l'usage de l'alkali volatil fluor dans la decoction de kina; sans négliger les moyens diététiques prescrits dans le traitement général.

Si l'ophtalmie est compliquée d'une manière éminente de la diathèse inflammatoire il ne faudroit point se permettre l'usage de l'alkali volatil que l'état inflammatoire des humeurs nait disparu ou considérablement diminué. Si le sujet est fort plethorique et irritable on doit user de ce remède avec beaucoup de modération, par ce que le médicament détermine dans les humeurs un état inflammatoire qui pourroit devenir d'angereuse soit en portant l'inflammation

locale à un trop haut Degré, ou en déterminant une inflammation dans quelque autre partie.

Les applications extérieures sont les Colyres, les Vesicatoires, le Seton, et le maza &c. les Colyres doivent être pris dans la classe des toniques. on Retire des merveilleux succès du Colyre du Docteur ange, qu'on fait avec le vin Blanc d'Espagne dans lequel on fait infuser à froid pendant qu'il que temps quelque Etamine de lait ou de Cuivre jaune. Si l'inflammation est trop Considerable, qu'il y est trop de Sensibilité, ou que l'humour qui l'abreffe la partie antérieure du globe de l'œil soit fort acrimonieuse, on doit employer les Emollients aqueux en bains locaux, lotions, ou Cataplasmes; les Vesicatoires qu'on applique sur le sommet de la tête, derrière les oreilles, ou à la nuque produisent des bons effets; mais doit-on les appliquer indifféremment sur l'une sur l'autre de ces trois parties? non Car les Vesicatoires appliqués sur le sommet de la tête dans le cas d'ophtalmie Strophuleuse augmente la fluxion en derivant l'humour vers les parties Supérieures; tandis qu'ils font des merveilles dans l'ophtalmie idiopathique de sorte que dans l'ophtalmie Strophuleuse on doit préférer leur application à la nuque, et

Sur tout Derriere les oreilles; Comme l'experience
le prouve. il en est de meme de l'application
Du seton, Du Caustere, et Du moxa. Les Venicatoires
doivent être également preferés aux autres moyens
et notamment dans l'Ophthalmie aigue; premierement
parce qu'ils agissent plus promptement, secondement
parce qu'ils augmentent l'action des Solides et des
Fluides, par l'introduction d'une certaine quantité
des sels des Cantharides.

Dans l'Ophthalmie Chronique on doit en reiterer
l'application alternativement Derriere les oreilles
et à la nuque, à moins qu'il ny ait quelque
Contre indication; Dans le cas on y suppleroit
par l'application Du seton, ou Du Caustere.

S'il y a des ulceres au tour Du cou on doit
y porter toute son attention pour en augmenter
la suppuration ou la retablir si elle a été
supprimée ou diminuée: ce moyen étant le
plus propre à diminuer l'intensité des maladies
secondaires. S'il y a des petits ulceres sur la cornée
on doit les traiter par les colyres detersifs: on y a
beaucoup d'huile de lin; je puis assurer même
servi avec le plus grand succès de l'eau verte
d'hartmanns, qui non seulement servi à guerir
les petits ulceres, mais, même à dissiper les engorgemens

De la Conjonctive qui Restent tres souvent apres
la guerison Des ulceres.

L'ankilopn, Lagilopn, L'enlantis, et la fistule
Lacrymale, se traitent par les moyen que j'ai
prescrits dans le traitement general des Hronelles
et par les moyen particulier à chacune Des
maladies.

quoique le vice Scrofuleux ne porte Pas commune-
ment ses effets sur les glandes salivaires, il arrive
quelque fois qu'elles sont gorgées Sympathiquement
ou par transposition de la matiere Scrofuleuse Des
tumeurs ou Des ulceres Du cou sur des glandes. la
Parotide, la maxillaire et la sublinguale sont les
plus ordinairement affectées.

Dans le traitement de la grenouillette outre les
moyen generaux on doit Employer un traitement
local, qui consiste à appliquer sur la tumeur
un Liniment fait avec l'huile de Camomille, et
l'alkali volatil; on l'applique interieurement
avec un pinceau imbu du Liniment qu'on passe
sur la surface de la tumeur, et exterieurement en
appliquant un linge imbu de ce medicament; si
le liniment volatil n'a pas produit l'effet Desiré, on
applique un emplatre Vesicatoire sous le menton.

Dont on entretient & le coulement jusqu'à - ce que la
tumeur ait entièrement disparu ou considérablement
+ diminuée; sans négliger la suppuration des ulcères
s'il en existe.

166. Depuis la première partie de mon mémoire j'ai
eu occasion de traiter deux maladies secondaires
aux voies salivaires. Dans la première il est question
d'un enfant âgé de six ans qui portoit depuis
trois ans une fistule qui attaquoit la glande maxillaire
accompagnée d'engorgement dans toutes les glandes
circonvoisines tant salivaires que lymphatiques, et
avec tous les autres symptômes chroniques. Je
commençai par le traitement interne; un mois
et demi après j'attaquai la fistule par les
trochisques de minium, qui décidèrent une bonne
suppuration, que j'entretenus pendant quelque temps
avec l'onguent brun; par ce moyen toutes les
petites durétés furent dissipées et la fistule guérie
au bout d'un mois: il restoit encore d'engorgement
des glandes circonvoisines que je n'ai fini de
dissiper qu'un mois et demi après, par l'application
assidue d'un emplâtre fondant fait avec parties
égales d'emplâtre de lique, et d'emplâtre de
Saxon Camphré, précédé de l'application d'un
épipastique derrière l'oreille, dont j'ai entretenue
le coulement pendant 15 jours; ce qui parut

Singulierement disposer les tumeurs à la
Résolution, puis qu'elles ont diminué d'un tiers
par ce seul moyen. Pour terminer la Résolution
de ses tumeurs, je fis faire un Liniment avec
le Sapon medicinal, et l'eau de chaux dont
j'animai ensuite l'activité en y joignant quel-
ques gouttes d'alkali volatil, ayant le soin d'en
augmenter graduellement la dose; après avoir
Linimentée la partie, on la couvrit avec l'empla-
tre goudant ci dessus. Ce qui termina entièrement
la maladie.



Le sujet de la seconde observation est un enfant, âgé
de trois ans et demi, d'une Constitution faible
quoique né des parents robustes; il portait depuis
environ deux ans une fistule salivaire à la
Parotide avec un engorgement aux glandes jugulaires.
Je commençai par attaquer la fistule par ce qu'elle
épuisait le sujet et qu'elle le faisoit marcher à
grands pas vers le marasme, par la quantité de
salive qu'il en sortoit. Pour cela je placai un
brochisque de minium dans l'ouverture fistuleuse
tant pour en agrandir l'orifice que pour en
détruire les bords qui étoient légèrement calleux;
après la chute de l'escharre les chairs étoient rouges
et vermeilles, fournissant toujours de salive qu'on en
mouloit qu'antité; je fis instiller quelques gouttes

De Beaume vint de mettre dans l'intérieur de l'ulcère pendant quatre ou cinq jours; au bout d'un quel temps les chairs du fond de l'ulcère furent de niveau avec les os; Pour lors jeus recours à la pierre infernale que je passois journellement et légèrement sur la surface des chairs, un peu de charpie rapée et un emplâtre agglutinatif furent les seuls moyens que j'employai ensuite pour mener l'ulcère à cicatrice.

il a Régné cette année 1790 une Epidémie Catharale qui a particulièrement attaquée les enfans du bas âge; elle s'annonçoit par une inquiétude accompagnée de fièvre, d'une légère difficulté de respirer et d'avaler, suivie d'assoupissement. Cette maladie qui a été mortelle pour la plupart, et qui n'allait que du jour au lendemain, consistoit comme l'ouverture des cadavres l'ont prouvé, dans un engorgement muqueux de la membrane pituitaire dans toute l'étendue des sinus de la base du crâne, du larynx et du pharynx; sans aucune autre marque pathologique des autres parties du corps; chez quelques uns cet engorgement n'attaquait que la moitié latérale de la base du crâne et des autres parties mentionnées ci dessus. on en a sauvé quelques uns par les évacuans et par l'application des vésicatoires à

La nuque et Derrière Les oreilles.



L'engorgement des amygdales se forme par (1)
fluxion ou par Congestion; Ce dernier est le plus
ordinaire dans cette maladie; Dans le premier cas
l'application des sangsues, ou des ventouses scarifiées
au dessous du menton sont préférables à la saignée
du bras, et à celle du pied, qui n'est pas sans danger
dans cette maladie (on peut dire qu'en general
les saignées locales sont préférables aux saignées
generales dans les maladies des enfans) apres la
saignée les vomitifs sont les remedes les plus efficaces.
Dans le traitement de cette maladie; on peut en
dire autant de l'application des vesicatoires au
dessous du menton et des Linimens Volatils; il n'en
est pas de meme des gargarismes Dans le 1er cas
ils doivent être Emolliens, ou Resolutifs Raffraichissans
et Dans le second cas au contraire ils doivent être
Echauffans. je me suis servi avec le plus grand succès
dans les engorgemens par Congestion d'un gargarisme
fait avec le bois de gayac infusé à chaud et qu'on
arrose ensuite avec l'alkali volatil. Si ces moyens
ne suffisent pas, et que les Cristes soient durs et
d'un volume à gêner la Respiration et la Deglutition
on doit les attaquer avec le Caustere actuel ou
Potentiel ou ce qui vaut encore mieux avec l'instru-
ment tranchant pour en faire la Rescision. —

L'engorgement des deux glandes situées à la partie
supérieure du larynx, entre les deux cordes vocales
ou dans les sinus de Morgagni, et qu'on nomme
glandes arénoïdes sont le siège d'une maladie
dont aucun auteur de ma connaissance ait
parlé: de hasard n'ayant fourni l'occasion de
la voir trois fois, je vais en donner la description.

(1)

Observation
Sur l'angine arénoïdienne

1^{re}. une fille âgée de 16 à 17 ans d'une constitution
strophuleuse, entra dans l'hôpital le 22^e jbre
1788. elle se plaignoit d'une douleur sourde, vers
les parties latérales et supérieures du larynx
accompagnée d'une légère difficulté de respirer
et sans fièvre; la langue étoit légèrement chargée
plutôt par la Diète qu'elle avoit observée que par
l'affection gastrique. elle fut saignée au bras, par
l'ordonnance de Mr. Farjon, et le lendemain elle
fut huetisée, ce vomitif parut avoir opéré quel
que amendement, on lui prescrivit un gargarisme
résolutif. le matin du 23^e me du mois la
difficulté de respirer augmenta considérablement,
la fièvre s'alluma, elle fut fort agitée; la douleur
devint plus vive, le visage se bouffit; et en
examinant l'intérieur de la gorge j'aperçus une
légère phlogose à laquelle on ne pouvoit pas

attribués les symptômes présents: Le soir elle fut
ressaignée deux fois sans la moindre diminution
des symptômes, elle fut injectée de nouveau le
l'endemain matin, on lui appliqua un cataplasme
de jusquiame au tour du cou; malgré tous ces
moyens la dyspnée augmenta considérablement, le
visage devint rouge, les yeux étincelaient, les veines
jugulaires se gonflèrent et palpitèrent, dans la nuit
elle eut des convulsions pour lesquelles je fus appe-
lée et elle mourut le matin.

à l'ouverture du cadavre faite en présence de
M^r Farjon et de tous les chirurgiens de la maison
j'ai trouvé les glandes arétoïdes excessivement
gorgées et bouchant la glotte, la membrane interne
de la trache artère légèrement phlogosée, les amygdales
et autres cistes peu gorgées, les poulmon boursoufflés,
la veine cave supérieure gorgée de sang de même que
les vaisseaux cérébraux &c.



2^e observation


une fille âgée de 18 ans, d'une forte complexion
entra à l'hôpital le 7^e juillet 1789 vers les trois
heures de l'après midi elle se plaignoit d'une douleur
fixe et vive sur les parties latérales et supérieures
du larynx, ce qu'elle nous indiquoit en y portant
la main, la dyspnée étoit si ne peut plus

34
Considerable, le Visage rouge et Bourboufflé, Perte
De la voix et de la parole, chaleur Considerable
à la Peau, le Poulx étoit dur, plein, et frequent,
En examinant l'arrière Bouche on n'y apperlevoit
Rien qui peut nous faire soupçonner l'inflama-
tion dans ses parties, les parties extérieures du
Ceu étoient dans leur état naturel, et les premières
Voies paroissent bien libres. la femme qui la
Conduisit à l'hôpital nous dit qu'elle étoit tombée
dans cet état d'une manière presque subite après
avoir bu un verre d'eau fraîche à la suite
d'une longue fatigue de la matinée; d'après
tout cela Mr Sarjon la fit saigner, et ordonna de
la Reppetter Deux fois avant de lui faire prendre
l'emetique, qu'elle prit vers le neuf heures du soir
sans lui Rettirer le moindre Soulagement: vers
le dix heures je fus la voir, je la trouvais dans
un état des plus affligeans, la dyspnée étoit portée
à son plus haut degré, le Visage sembloit échimo-
sé, le poulx étoit petit serré et Convulsif; les Convul-
sions la prirent Bientot après, dans Lesquelles elle
mourut vers de Blue heure du matin.

à L'ouverture du Cadavre faite par Mr Martin
mon Secoud; nous trouvames les glandes ariténoides
Considerablement gorgées et bouchant la glotte, la
membrane interne du larynx gorgée, celle de la
trachee artère legerement phlogosée, les poulmons
Bourboufflés et gorgés de sang, la Veine Cave supérieure

et les vaisseaux Cerebraux également gorgés.

3^e obsⁿ un enfant âgé d'environ 9 ou 10 ans, d'une Constitution assez robuste, entra dans l'hôtel Dieu le 9^e juin 1769, avec tous les symptômes décrits dans les deux précédentes observations. Mr Rouché Médecin de l'hôtel Dieu lui survivance se fit saigner du bras, et ordonna l'emetique pour le soir, ou trois heures après la saignée, et m'en laissa le soin. Vers les dix heures je fus le voir le trouvant à peu près dans le même état, je lui appliquai un large vésicatoire au tour du cou, qui produisit tout l'effet qu'on pouvoit en attendre. Le lendemain matin le malade fut sensiblement mieux, on continua son régime on soutint l'effet des vésicatoires par les moyens ordinaires, il fut purgé le 5^eme jour et le 10^eme, il fut parfaitement guéri.



Comme le diagnostic de cette maladie pourroit être confondu avec la croup ou angine stridulente, et avec l'angine suffocante convulsive, il est essentiel d'en établir les signes de la manière la plus stricte d'autant plus que cette maladie est peut-être plus commune qu'on ne pense.

Cette maladie qu'on peut appeller angine aritenoidienne s'annonce par une difficulté de

Respiree, qui est plus pressante, et dont les progrès sont plus Rapides si elle se forme par fluxion, une douleur fixe sur les parties latérales et Supérieures du Larynx, accompagnée d'un sentiment de Constriction dans cette partie, les parties extérieures ne sont ni enorgées ni douloureuses, en examinant l'intérieur de la Bouche on n'y voit rien du moins dans le premier temps, la voix et la parole diminuent insensiblement, et à proportion que l'engorgement fait des progrès, la voix à un son aigu dans le premier temps, elle devient Raucque et s'éteint ensuite. Lorsque l'engorgement fait des progrès du côté de la membrane interne du Larynx et de la trachée artère, le visage devient Rouge et Bouffi, les yeux étincelans, les veines jugulaires se gonflent et palpitent, l'arrière bouche devient phlogosée, le pouls est dur plein et fréquent dans le premier temps, il devient ensuite petit et Convulsif. (a) la Suffocation augmente l'agitation, et les Convulsions surviennent, et le malade meurt suffoqué et apoplectique. tous ses Symptomes ont une marche beaucoup plus Rapide lorsque l'engorgement se fait par fluxion et que la Constitution du malade est forte et Robuste; comme on peut le voir par les observations ci dessus

(a) Les signes febriles peuvent varier dans différents Sujets.

Dans le traitement de l'angine aréteoviréne (considérée
comme Strophuleuse, il faut commencer par
Remédier à l'engorgement des des glandes, avant
d'attaquer le vice, Pour cela je crois convena-
ble d'appliquer des sangsues, des ventouses seches,
et Scarifier sur les Parties latérales et Supérieures
du larynx, de preference à la saignée du bras
ou du pied; par la raison que les dernières
augmentent l'inertie des forces vitales, sans
produire le même effet sur l'engorgement.

(Procédé que je crois généralement préférable
dans toutes les maladies des enfants qui exigent
la saignée.) après quoi on doit administrer
un ou deux vomitifs; Les liniments Volatils sur
le larynx et l'application des vesicatoires sur la
Partie, sont des tous les moyens externes, ceux
dont on doit attendre le plus de succès. L'insu-
ffisance des des moyens, et l'augmentation de
accident, ne nous laissent d'autre Ressource pour
sauver la vie au malade, que l'opération de
la bronchotomie. Car si l'opération de la
Bronchotomie convient dans l'angine cet Bien
particulièrement dans celle-ci.



La Croup maladie particulière aux enfants, peut être regardée dans quelques circonstances comme maladie Strophuleuse secondaire. N'ayant eu cette maladie qu'une seule fois, je me bornerai à jeter quelques réflexions qui tendront à prouver que cette maladie doit être regardée comme une maladie mucqueuse ou Catharale, et non comme une maladie inflammatoire ou spasmodique, comme l'ont avancé la plupart des auteurs.

Pour prouver cette assertion je mettrai de propositions suivantes. 1° Cette maladie n'affecte ordinairement que les enfants, depuis le sevrage jusqu'à l'âge de douze ans, temps le plus propre à la Diathèse mucqueuse. 2° elle survient particulièrement en hiver dans les temps froids et humides. 3° elle est plus commune et comme endémique dans le nord. 4° les enfants gras et qui ont la fibre lâche y sont plus sujets que les autres. 5° elle se manifeste par les symptômes des maladies Catharales, tandis que les symptômes inflammatoires ne sont que consécutifs et ne paraissent souvent qu'après que la fausse membrane est formée. 6° à l'ouverture des Cadavres on observe que cette fausse membrane est épaisse et d'un caractère mucqueux, qu'elle ne tient à la tunique interne de la trache

artere que par quelques petit filets mucqueux
très delié, et qu'entre cette fausse membrane et la
trache, on y trouve une matiere mucqueuse assés
fluide, qui se porte jusques dans les bronches.

4° que la tunique interne de la trache-artere
se trouve sans inflammation, sans ulceration, et par-
faitement saine, et que si elle s'éloigne de cet
etat dans quelques circonstances on ne la trouve
que légèrement phlogosée.

D'après toutes ces considerations je pense que la
Croup est une maladie mucqueuse ou Catarrhe
dans son principe, et que l'inflammation n'est que
secondaire; à peu près comme dans les peripneu-
monies pituiteuses, ou l'inflammation n'est que
secondaire à l'engorgement lymphatique; et que
conséquemment à cela on doit peu insister sur
les saignées generales. que les somnif dans le
premier temps, l'application des sangsues, des
ventouses secher, et scarifiées, celle des vericatoires
sur la partie antérieure du cou, et les fumiga-
tions emolientes et résolutive doivent faire la
base du traitement de cette maladie.

Ce que je dis ici en passant sur cette maladie, ne
sont que des apperçus generaux, qui meritent d'être
étayés par des nouvelles observations.



De la phtisie Scrophuleuse

La phtisie qui n'est que trop souvent la suite
des Scrophelles affecte particulièrement, les Sujets
d'une Constitution faible et Delicate, Ceux qui
naissent des Parens phtisiques, ou qui ont propension
à cette maladie; elle survient le plus fréquemment
depuis la 15^{eme} jusqu'à la 25^{eme} année.

Dans la phtisie Scrophuleuse les glandes lymphatiques
des Poulmons sont gorgées primitivement, et les
Bronchiques ne le sont que Consécutivement (voyez
ce que dit là dessus Mr Portal memoire de
l'Académie Royale des Sciences de Paris années
1780. et 1781.) j'ai observé à l'ouverture des
Cadavres Scrophuleux que dans la phtisie con-
mençante, les Poulmons sont d'une texture mol-
lasse et gorgés d'une grande quantité de mucosité
lymphatique. Dans la phtisie ancienne j'ai observé
les glandes lymphatiques des Poulmons gorgées et
dures, et le tissu interlobulaire plus ou moins
épais et durci. D'ailleurs les crachats pituiteux
que rend le malade prouvent assez que la
maladie reside dans le Systeme Lymphatique
et glanduleux des Poulmons.

Dans la Cure de cette maladie, outre l'exercice, et
le Regime que j'ai déjà prescrit, on doit attendre
des bons effets des incisifs donnés à propos, et des différentes

application exterieures.



Dans le principe de cette maladie, Mr de Sauvages conseille les pillules balsamiques de Morton, à la dose d'un scrupule matin et soir, par dessus la quelle pillule il recommande de prendre un verre d'apozème pectoral incisif, ayant le soin de faire précéder une saignée à l'usage de ses remèdes. L'usage du creton de fontaine dont Mr Pouteau a retiré de si grands avantages dans la phtisie phlegmoneuse, et que Mr Haller recommande également dans sa matière médicale, pourroit être d'un très grand secours dans la phtisie croupaleuse; Car si d'un côté Mr Pouteau a guéri plusieurs phtisies phlegmoneuses par l'usage de ce végétal, comme je n'en doute pas; qu'els effets ne devons nous pas en attendre dans la phtisie croupaleuse où il paroît sans contre dit beaucoup mieux indiqué; D'un autre côté le creton agit en stimulant et excitant l'action des solides, et en divisant et atténuant les fluides mucqueux et épais; vertus, qui le rendent doublement recommandable dans cette espèce de phtisie, où les forces toniques sont entièrement débiles et les sucs lymphatiques et mucqueux qui forment l'engorgement d'une tenacité assez considérable. on donne le creton à manger ou on en fait prendre le suc, à la dose de deux

jusqu'à quatre onces, Coupé avec autant d'eau
minérale ferrugineuse naturelle ou artificielle;
on peut faire prendre dans la journée de l'eau
dans laquelle on a mis des Clous de Rouille, ou autre
Vieille ferraille &c.

des fumigations seches faites avec la mirhe,
l'encens, le mastic, le benjoin, la Cire vierge
les roses rouges, la tormentille &c. produisent de
bons effets. qu'elques auteurs nous recommandent de
Conduire les vapeurs seches dans l'intérieur de la
trache-artere à la faveur d'une machine qu'on
adapte dans la bouche du malade et qui ferme
en même temps les narines; on sent d'avance
Combien Cette maniere d'administrer les fumigation
est d'angereuse. Mr Harjon Celebre medecin de cette
ville ma assuré avoir vu des malades prêt à
suffoquer, en se servant de cette machine. il vaut
donc bien mieux repandre la fumée dans la
chambre du malade, qu'on a le soin de tenir
bien fermée, que de l'exposer à être suffoqué.

Voyons maintenant le cas, le temps, et le
lieu ou on doit appliquer les vesicatoires, le
Cautere, et le moxa; moyens qui sont spécialement
recommandés dans le traitement de cette
maladie.

Dans le principe de la phtisie Strophuleuse, si le malade se plaint d'une douleur piquante sur les parties latérales de la poitrine avec fièvre et difficulté de respirer; il convient alors de faire une saignée locale, en appliquant sur le point douloureux une ventouse, et de tirer par là quelques onces de sang par des scarifications assez profondes; quelques heures après on applique sur la même partie un bon Vesicatoire dont on entretient l'écoulement pendant un certain temps; s'il y a des signes de sabure dans les premières voies il faut les évacuer, par les émétiques, ou les purgatifs suivant les cas; après avoir suffisamment évacué le malade on doit le faire passer à l'usage du Cresson, si le sujet est fort humoral on peut placer un Caustère au bras du côté douloureux (le Caustère qui convient dans les phtisies récentes, ne convient point en général dans les anciennes parce qu'il affaiblit encore plus le sujet.) Si malgré tous ces moyens la phtisie fait encore des progrès il faut appliquer le moxa sur le point douloureux et en réitérer l'application si le cas l'exige. Si sur le point douloureux on apperçoit une élévation il ne faut point hésiter à donner issue à la matière soit avec l'instrument tranchant ou avec le caustique.

ayant le soin de faire marcher le traitement interne
de concert avec le traitement externe, et notamment
l'usage du Cresson.

Si la phtisie s'annonce sans point douloureux ni
sans élévation sur un des points de la circonférence
de la poitrine; il convient alors outre les moyens
internes, il convient alors d'appliquer le ventiloire
ou le moxa sur la partie postérieure et supérieure
de la poitrine, ou à la partie antérieure et inférieure
du cou, ou aux deux endroits à la fois, si le
cas l'exige; et cela pour des raisons que l'anatomie
seule peut nous découvrir. (a)

(a) Les deux plevres sont garnies à leur partie extérieure
d'une grande quantité de tissu cellulaire qu'on nomme
faute lame de la plevre, ce tissu cellulaire s'implante
dans la propre substance des poulmon à la partie postérieure
et supérieure de ce viscère, et forme ce qu'on nomme
tissu interlobulaire. ou pour mieux dire les deux
plevres en se réfléchissant à la partie postérieure de
la poitrine, pour tapisser la surface des poulmon, et
venir former le mediastin donnent leur tissu cellulaire
qui se repand dans les poulmon; tissu cellulaire qui
communiqua directement avec le tissu cellulaire de la partie
postérieure et supérieure de la poitrine, et de la partie antérieure
et inférieure du cou, comme le prouve très bien d'emphysème
qui survient à ces parties lorsqu'une personne meurt suffoquée
ou étranglée; on peut joindre à cela l'anatomie des vaisseaux
capillaires sanguins et lymphatiques internes, et externes

S'il y'a d'ulceres scriptuleux au tour du cou ou à d'autres parties il faut en augmenter la suppuration ou la rétablir si elle a été supprimée ou diminuée

L'engorgement du tissu cellulaire logé dans le second écartement antérieur du médiastin s'annonce dit Salus Diversus, par une douleur fixe sur la partie antérieure et moyenne de la poitrine accompagnée d'une chaleur brûlante de difficulté de respirer, et de fièvre; les progrès rapides et les ravages qui suivent la suppuration de ce tissu, rendent cette maladie fort d'angereuse; il est donc convenable d'orsque les symptômes commencent à se déclarer d'employer tous les moyens propres à faciliter la résolution de cet engorgement. Pour cela si l'engorgement est considérable, ce qu'on jugera par la vivacité des symptômes; il convient d'appliquer sur le sternum quelques ventouses scarifiées et quelques heures après un large vésicatoire sur la même partie, sans négliger les évacuans si le cas le requiert. Si malgré tous ces moyens cet engorgement se termine par la suppuration il faut au plutôt donner issue à la matière purulente, sans quoi elle exerce ses ravages du côté du sternum du côté du larynx, et du côté de la cavité de la poitrine en perforant le péricarde et le médiastin, et formant un pyéisme dans la cavité du thorax. j'ai vu périr un jeune homme dans

L'hôpital de toutoube pour avoir différé de donner issue
à la matière purulente, se fut corrodé le médiastin
et s'ouvrit dans la poitrine, le sternum fut carié
dans une grande étendue et dans toute son épaisseur.
Ce qui nous procura d'occasion de voir les mouvements
du cœur.

L'engorgement des deux glandes asophagiennes dont
j'ai déjà décrit les symptômes dans la première partie
de ce mémoire, demandent outre les moyens généraux
l'application des vésicatoires sur les parties latérales
et antérieures du cou. Les bons effets que j'en ay vu
nettement m'engagent à les proposer comme un des
principaux moyens qu'on puisse employer contre
cette maladie.

1^{ere} observation

Le nommé Jean Vigier entra dans l'hôtel
Dieu, le 2^{eme} du mois de novembre 1786. avec
une douleur sourde à la partie antérieure et
moyenne de la poitrine, accompagnée de difficulté
d'avaler et de tous les autres symptômes que j'ai
déjà décrits; un parjon médecin en chef de
l'hôtel Dieu lui fit administrer un somnif dont
il ne prit qu'une très petite partie, et qui ne causa
que quelque légère nausée; le 3^{eme} jour à
l'atter de son entrée il lui fit appliquer un large
vésicatoire au tour du cou, qui eut tout le succès

possible; Dès le moment la Douleur s'appela, le malade avala avec aisée de facilité, et la maladie fut entièrement terminée le 7^{ème} jour par le secours des Evacuans. il Rentra dans l'hôpital Deux mois après ~~Dans l'hôpital~~ avec une fièvre gastrique fort considérable, Du 5^{ème} au 6^{ème} jour la Douleur sourde, et la Difficulté d'avaler reparurent, et il perit le 7^{ème}. à l'ouverture du Cadavre je trouvais les glandes œsophagiennes excessivement gorgées, L'œsophage considérablement rétréci et la Cavité presque entièrement effacée à l'endroit de la Conduit correspondant à ses deux glandes.



2^{ème} observation

un Cordonnier Rue des Penitens noirs à Toulouse fut à peu près la même maladie Mr Abadie médecin de cette ville employa inutilement tous les moyens que l'art lui suggéra; le malade resta dans cet état pendant deux mois, sans pouvoir avaler aucune espèce de substance; il tomba dans le marasme, et perit; quatre heures avant son dernier moment les glandes s'abaisserent du Côté des poulmon, le malade cracha une grande quantité de pus; Des ce moment la déglutition devint facile, on fit avaler au malade une prise de Bouillon; et il expira une heure après à

L'ouverture du cadavre que je fis en présence de
mr abadie, je trouvai les glandes œsophagiennes
adhérentes à la surface des poulmon, et un foyer
commun à des glandes et à cette partie des poulmon
qui adhéroit à des glandes, la partie de l'œsophage
qui est entourée par des glandes étoit rétrécie et
ulcérée sans être entièrement percée, en ouvrant
le péricarde je fus fort étonné, de même que mr
abadie, de trouver toute la surface du cœur ulcérée
et de l'érosion assez considérable, sans que le malade
ait eu aucun symptôme qui annonçât cet organe
malade; et sans même qu'on peut soupçonner
que le pus vint des glandes œsophagiennes, d'après
l'éloignement, la situation, et l'intégrité de la surface
extérieure du péricarde.

il faut noter qu'on n'avoit point appliqué les
vésicatoires, au malade qui fait le sujet de cette
observation; moyen qui peut être auroit procuré la
guérison de cette maladie.

Le Carreau, maladie particulière aux enfants consiste
dans l'engorgement ou obstruction des glandes et des
vaisseaux lymphatiques du mésentère. Cette maladie
est causée par la débilité ou atonie du système
lymphatique et glanduleux du mésentère, par la
glutinosité de la lymphe, par la crudité et la

4. Velocité du chile, par une mauvaise éducation
phtisique, par l'usage inconsidéré des purgatifs
comme le dit Sydenham, par l'usage des absorbans
terreux, et par la repercussion de quelque humeur
hétérogène sur le mesentère, telle que d'humeur
Néphrétique, dartreuse, phtisique, et celle des Eructes
lactées &c. les signes du Carreau sont assez évidens
le Volume et la Dureté du Ventre sans douleur
l'amaigrissement de toute les parties du corps une
Diarrhée soutenue, le pouls petit vite et intermittent
cet état de tristesse et de Langueur, un appétit d'or-
donné chez les uns, l'inaipetence chez les autres, et la
soif plus vive &c.

aux moyens Diététiques de ja proposés on doit joindre
l'usage des naseux, les Bains de mer, les frictions &c.
pour les moyens médicaux on a proposé les
différentes préparations mercurielles, telles que la pama-
cée, le mercure gommeux de plenck, le Calomel
d'eau mercurielle de theden, le mercure doux martial
le fondant de plummer, et celui de noten &c. les
différentes préparations martiales, comme l'essence
douce de sthal, la teinture martiale de Ludwig, et
les différentes préparations antimoniales &c. Dans le
moment où j'écris je commence le traitement de
cette maladie à un enfant âgé de six ou sept ans

il prend aujourd'hui la Decoction d'anonis spinosa
dont Mr^s acrel, et Richter, disent avoir retiré des grands
succès, Dans une Cuiller de cette Decoction il prend
tous les matins 4 grains de rhubarbe en poudre,
autant de terre foliée de tartre et 4 grains de ammoniac
Epuré. je voudrois pouvoir rendre ^{Compte} à L'illustre
Academie, à qui j'ai l'honneur de presenter ce petit
memoire, De L'effet des moyens que j'employ, et de
ceux que je me propose d'employer par la suite.

Des tumeurs Blanches Prophuleuses

Dans la premiere espece de tumeur Blanche Prophuleuse
Dès que le malade commence à sentir une douleur
fixe, profonde, et violente dans l'articulation, il
faut d'abord appliquer un vesicatoire sur le point
douloureux, et lui reiterer l'application si le cas l'exige
sans negliger les moyens dietetiques et mediceinaux.
Si les moyens ne suffisent pas il faut lui venir à
l'application du moxa, sur l'endroit de la douleur
ayant le soin d'en entretenir la suppuration pendant
longtemps par les moyens convenables. Si malgré tous
les moyens la maladie fait des progrès, et qu'il se fasse
un épanchement dans l'interieur de l'articulation, on
fera deux ouvertures dans les lieux les plus propices
pour passer un seton, on pansera ensuite suivant

les Regles de l'art, en se servant des injections et
des autres moyens propres à hâter l'exfoliation
Dans les tumeurs blanches Profuleuses de la seconde
espece; on doit commencer le traitement par l'ap-
plication des sangsues, et des ventouses scarifiées sur
la tumeur, on enveloppe ensuite l'articulation d'un
large vericatoire dans lequel on joint le camphre;
on en réitere l'application si le cas le exige. j'ai vu
cette methode suivie des plus grands succès. le moxa
convient encore dans le cas; Mr Porteau nous rap-
porte nombre des cures operées par ce moyen. j'ai
vu Reukin en faire le cas l'application des Concombre
sauvage pillé, Celle du Cresson de fontaine, le
Cataplasme fait avec le mout et le lait, celui de
saron, la farine de pois chiches cuite dans le
Vinaigre de. mais un moyen qui produit constamment
plus d'effet, sont les douches faites avec une lessive
des cendres de sarment animée avec le sel ammoniac
et le sel marin. j'ai donné mes soins à un abbé
qui depuis huit mois portoit une tumeur froide
énorme dans l'articulation du genou. après avoir
employé le traitement interne convenable, je lui
fis faire des douches sur la tumeur, immédiatement
après la douche je lui faisois donner des frictions
jusqu'à siccité avec 30 ou 40 grattes d'alkali volatil.
au 12^{eme} jour a mon grand étonnement et au sien

il fut entièrement guéri.

Si après la Disparition de la tumeur il restoit
de Roideur dans l'articulation, on y Remediera
par les Douche, lotion et liniment Emolient.

En terminant ici mes Recherches sur les Gonorées
je ne me flatte point d'avoir Rempli la tâche
que je m'étois imposée, la matière est trop vaste
et trop épineuse; les travaux des Savans qui ont
traité ce sujet Devroient redoubler mes craintes,
mais mon Emulation animée par la persuasion
de n'avoir avancé que des principes dont la
Vérité est incontestable me rassure. —